

Biopsias

Bacaf de mama, tiroides, tejidos blandos

- resultados anteriores
- No requiere ayuno

Trucut de mama, tiroides, tejidos blandos

- Traer estudios anteriores
- Si toma anticoagulantes WARFARINA u otros, el médico tratante debe dar indicaciones para suspenderla
- No requiere ayuno

Trucut de próstata

- Dieta líquida sin granos ni lácteos (-No consumir lácteos, bebidas oscuras, granos, carnes rojas)
Puede consumir aromáticas, gelatina, caldo sin grasa y jugos en agua
- A las 8:00 p.m. Aplicar Un enema rectal de 1000cc
- 2 horas antes de la cita, aplicar otro enema rectal de 1000cc
- Día de estudio, asistir en completo ayuno,
- Presentarse 60 minutos antes de la cita
- Resultados de laboratorios, tiempos de coagulación TP-TPT
- Cefazolina amp 1 gr intravenoso una hora antes y 1gr intravenosa una hora después.
- Paciente debe estar canalizado.
- Si toma anticoagulantes WARFARINA u otros, suspenderlo 5 días antes
- Uroanálisis y urocultivo para evaluar antibiótico.

Trucut de hígado o lesiones intra abdominales

- Resultados de estudios anteriores
- Si toma anticoagulantes WARFARINA u otros, el médico tratante debe dar indicaciones para suspenderla
- Resultados de TP-TTP - plaquetas
- Se debe realizar interconsulta por parte de médico radiólogo intervencionista para suceptibilidad del procedimiento

Nefrostomía / derivación de vía biliar

- Resultados de apoyo diagnóstico anteriores
- Si toma anticoagulantes WARFARINA u otros, el médico tratante debe dar indicaciones para suspenderla
- Resultados de TP-TTP - plaquetas
- Se debe realizar interconsulta por parte de médico radiólogo intervencionista para suceptibilidad del procedimiento

Nota: Todo paciente debe tener firmado consentimiento informado.

Histerosalpingografía

- Estar entre el sexto a noveno día del periodo menstrual (6 a 9)
- Realizarse un frotis vaginal, tres días antes de su ciclo menstrual, si el ciclo es irregular debe realizarlo el primer día del periodo, el resultado debe salir negativo para infecciones.
- No tener relaciones sexuales dos días antes del estudio
- Tomar 1 tableta de Buscapina (recomendación) 1 hora antes del estudio
- Asistir con ropa cómoda